

**ОТНОШЕНИЕ К ЭВТАНАЗИИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ И РОДСТВЕННИКОВ БОЛЬНЫХ В СВЕТЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВРАЧА**

Деларю В.В., Карганова И.Н.

Волгоградский государственный медицинский университет, Россия

Разносторонняя информированность врача по таким актуальным проблемам современной медицины, как эвтаназия, трансплантология,

генная инженерия, искусственное оплодотворение и т.д. предполагает знания не только чисто медицинских и правовых вопросов, но и многих психологических аспектов, в частности, сложившихся у врачей, медицинских сестер, населения представлений по данным вопросам. Однако посвященные этим проблемам исследования еще немногочисленны, что и послужило основанием для изучения отношения к эвтаназии у 98 врачей, 101 медицинской сестры и 143 родственников больных, находившихся на стационарном лечении в анестезиолого-реанимационных и нейрохирургических отделениях (возраст опрошенных родственников был 20 лет и старше).

О неприемлемости активной эвтаназии заявили 42,9% врачей, причем, если среди врачей со стажем более 3-х лет таких было 44,2%, то среди начинающих врачей (со стажем до 3-х лет) - только треть - 33,3% (среди медсестер о неприемлемости активной эвтаназии заявила только четверть опрошенных - 25,7%). В то же время для 45,9% опрошенных врачей (и 48,6% медсестер) активная эвтаназия в определенных случаях оправдана (влияние стажа на приверженность подобной точки зрения не было выявлено - о допустимости в определенных ситуациях активной эвтаназии заявили 50,0% врачей со стажем до 3-х лет, 46,9% врачей со стажем от 3-х до 10-ти лет и 45,9% врачей со стажем 10 лет и более). Еще 11,2% врачей и 25,7% медсестер затруднились ответить на данный вопрос.

Неприемлемой пассивную эвтаназию считали уже всего 28,6% опрошенных врача, причем чаще всего это были наиболее стажированные специалисты (среди них подобную точку зрения высказали 35,2% против 25,0% среди проработавших до 3-х лет и 18,8% среди имеющих стаж 3-9 лет); среди медсестер подобной точки зрения придерживалась всего одна пятая часть опрошенных - 21,8%. В то же время практически две трети опрошенных врачей (63,3%) считали пассивную эвтаназию в определенных случаях оправданной; чаще всего такой позиции придерживались специалисты со стажем от 3-х до 9-ти лет (75,0%), а реже - врачи со стажем 10 лет и более (55,6%; $p < 0,01$). В определенных случаях оправданной пассивная эвтаназия была для 48,5% медсестер; затруднились ответить на данный вопрос 8,1% и 29,7% медсестер.

Согласно опроса родственников больных об их отношении к пассивной эвтаназии, то она была неприемлемой для 22,4% респондентов, причем с увеличением их возраста увеличивалось и число сторонников такой позиции (14,9% среди лиц до 39-ти лет; 25,4% среди 40-59-ти летних и 27,3% среди лиц в возрасте 60 лет и более). Оправданной в определенных случаях пассивная эвтаназия была для 46,8% респондентов; мужчины чаще высказывали подобную точку зрения - 56,0% против 41,9% у женщин; $p < 0,05$. Реже всего оправ-

данной пассивную эвтаназию считали лица 40-59-ти (38,1%), а чаще всего - в возрасте до 40 лет (55,3%; $p = 0,05$). Затруднились ответить на данный вопрос почти треть респондентов - 30,8%. Таким образом, можно говорить, в целом, о достаточно позитивном отношении к пассивной эвтаназии опрошенных родственников больных при частой неопределенности своей позиции, даже в плане её декларирования. Позитивное отношение родственников больных к эвтаназии, в свою очередь, повышает вероятность их обращения с соответствующими просьбами к медицинским работникам.

В тоже время заслуживает внимания достаточно высокая частота оправданности и приемлемости эвтаназии среди врачей, особенно среди молодых специалистов, причем в первую очередь настораживает подобная позиция относительно активной эвтаназии (пусть это только и заявляемая позиция). Как известно, в России статья 45-я "Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан" (от 23.07.1993г.) прямо запрещает эвтаназию, осуществление которой попадает под статью 105-ю (убийство) Уголовного кодекса РФ от 1996г. При этом ведущиеся как в мире, так и в России дискуссии о легализации эвтаназии рассматривают (только рассматривают!) возможность легализации почти исключительно пассивной эвтаназии, причем, по крайней мере, в ближайшее десятилетие легализация даже пассивной эвтаназии в нашей стране крайне сомнительна.

Поэтому представляется, что полученные данные об отношении к эвтаназии медицинских работников и родственников больных целесообразно использовать в учебном процесс (как на этапах до-, так и постдипломного обучения) не только при рассмотрении психологических аспектов этой проблемы, но в плане корректировке педагогических подходов при её изложении (в частности, для корректировки позитивного отношения к ней).